

کرم شناسی

سوال ۱ - آزمایش مدفوع در تشخیص آلودگی انسان به همه کرمهای زیر کاربرد دارد به استثناء:

- (الف) پاراگوئیموس و سترمانی
(ب) فاسیولوپسیس بوسکی
(ج) کاپیلاریا هپاتیکا
(د) کاپیلاریا فیلپینن سیس

سوال ۲ - شکل نوزادی کدام انگل زیر در انسان بوجود می آید؟

- (الف) فاسیولوپسیس بوسکی (ب) هیمنولپیس نانا (ج) دیفیلوبوتریوم لاتوم (د) آسکاریس لومبریکوئیدس

سوال ۳ - کدامیک از بیماری های انگلی زیر می تواند منجر به مشکلات بینایی در انسان شود؟

- (الف) تریکوریازیس (ب) تریکوسترونزیلیازیس (ج) توکسوکاریازیس (د) آنکیلوستومیاژیس

سوال ۴ - تخم کدامیک از کرمهای زیر به روش های میکروسکوپی معمول قابل تمایز هستند؟

- (الف) تنیا ساژیناتا - تنیا سولیوم
(ب) هیمنولپیس نانا - هیمنولپیس دیمینوتا
(ج) نکاتور آمریکانوس - آنکیلوستوما دئودناله
(د) اکینوکوکوس گرانولوزوس - اکینوکوکوس مولتی لوکولاریس

سوال ۵ - کارسینومای مجاری صفراوی در آلودگی به کدامیک از انگل های زیر مشاهده می شود؟

- (الف) فاسیولا هپاتیکا (ب) دیکروسلیوم دندریتیکوم (ج) فاسیولوپسیس بوسکی (د) اپیستورکیس ویورینی

سوال ۶ - اسپارگانوز ناشی از آلودگی انسان به کدامیک از انگل های حیوانی زیر است؟

- (الف) شیسستوزوماها (ب) اسپیرومتراها (ج) آنکیلوستوماها (د) توکسوکاراها

سوال ۷ - کانیبالیسم (هم نوع خواری) در انتقال و چرخه کدامیک از انگل های زیر نقش دارد؟

- (الف) تنیا ساژیناتا
(ب) دیکروسلیوم دندریتیکوم
(ج) تریشینلا اسپیرالیس
(د) اکینوکوکوس گرانولوزوس

سوال ۸ - مرحله لاروی کدامیک از کرم های زیر در بدن انسان سریع تر به بلوغ می رسد؟

- (الف) تنیا ساژیناتا (ب) تریشینلا اسپیرالیس (ج) تنیا سولیوم (د) آسکاریس لومبریکوئیدس

سوال ۹ - میزبان نهایی ماکروکانتورینکوس هیرودیناسئوس کدام گزینه است؟

- (الف) خوک (ب) گاو (ج) بز (د) گوسفند