

سوال ۱۰ - سیستمی سرکوس کدامیک از گونه های تنیا عمدتاً در کبد مشاهده می شود؟

- الف) تنیا ساژیناتا (ب) تنیا سولیوم (ج) تنیا مولتی سپس (د) تنیا آسیاتیکا

سوال ۱۱ - از نشانه های بالینی آلودگی شدید به کدامیک از انگل های زیر ادم صورت و اسهال توکسیک است؟

الف) هتروفیس هتروفیس

ب) فاسیولا هپاتیکا

ج) فاسیولوپسیس بوسکی

د) پاراگونیموس وسترمانی

سوال ۱۲ - در کدام نماتود زیر جفت گیری در محلی به غیر از محل استقرار نهایی کرم صورت می گیرد؟

- الف) اکسیور (ب) تریکوسفال (ج) آسکاریس (د) پیوک

سوال ۱۳ - تخم کدام انگل هنگام دفع از میزبان، جنین دار است؟

- الف) فاسیولا (ب) کلونورکیس (ج) پاراگونیموس (د) دیفیلوبوتریوم

سوال ۱۴ - عامل لارو مهاجر پوستی کدام است؟

- الف) شیزستوزومای پرندگان (ب) توکسوکارا کتی (ج) توکسوکارا کانیس (د) آنکیلوستوما کانینوم

سوال ۱۵ - مبارزه بیولوژیک در کنترل کدام انگل زیر بکار رفته است؟

الف) دیکروسلیوم دندرتیکوم

ب) شیزستوزوما مانسونی

ج) تنیا ساژیناتا

د) تریشینلا اسپیرالیس

سوال ۱۶ - شدیدترین فرم بالینی شیزستوزومیازیس توسط کدامیک از شیزستوزوماهای زیر اتفاق می افتد؟

- الف) ش. اینترکالاتوم (ب) ش. مانسونی (ج) ش. همتوبیوم (د) ش. ژاپونیکوم

سوال ۱۷ - استفاده از تکنیک نات (knott) در تشخیص آلودگی به کدامیک از فیلرهای زیر فاقد ارزش است؟

- الف) ووشریا بانکروفتی (ب) بروگیا مالایی (ج) اونکوسرکا ولولوس (د) لوآ لوآ

سوال ۱۸ - مقدار خون مصرفی روزانه توسط کدام کرم زیر بیشتر از بقیه است؟

الف) آنکیلوستوما دنودناله

ب) نکاتور امریکانوس

ج) تریکوسترونزیلوس اورینتالیس

د) تریکیوریس تریکیورا