

سوال ۲۸ - کدام روش زیر در تعیین Viability تخم شیستوزومها در مدفوع مناسب است؟

- الف) رنگ آمیزی باگیمسا
- ب) استفاده از مواد اکسید کننده
- ج) استفاده از آنزیم
- د) حرکت مژهها در سلولهای شعله‌ای

سوال ۲۹ - پیشگیری از ابتلا به کدام انگل زیر حتی در جوامع پیشرفته با دشواریهای زیادی همراه می‌باشد؟

- الف) تنیا ساژیناتا
- ب) انتروبیوس ورمیکولاریس
- ج) تریکوریس تریکیورا
- د) آسکاریس لومبریکوئیدس

سوال ۳۰ - علائم سندروم لوفلر در آلودگی به کدام یک از کرم‌های زیر شدیدتر است؟

- الف) آسکاریس لومبریکوئیدس
- ب) نکاتور آمریکانوس
- ج) آنکیلوستوما دئودناله
- د) تریکوسترونیلوس اورینتالیس

سوال ۳۱ - در سیر تکاملی کدامیک از کرم‌های زیر حلزون‌های خشکی زی نقش دارند؟

- الف) هتروفیس
- ب) فاسیولا
- ج) دیکروسلیوم
- د) پاراگونیموس

سوال ۳۲ - در مقایسه لارو رابدیتوئید استرونژیلوئیدس استرکورالیس (S.s.) و کرم‌های قلابدار مورد زیر صحیح است؟

- الف) حفره دهانی کرم قلابدار طویل‌تر - ریشه ارگان تناسلی در S.s. بزرگتر
- ب) حفره دهانی کرم قلابدار طویل‌تر - ریشه ارگان تناسلی در S.s. کوچکتر
- ج) حفره دهانی کرم قلابدار کوتاه‌تر - ریشه ارگان تناسلی در S.s. بزرگتر
- د) حفره دهانی کرم قلابدار کوتاه‌تر - ریشه ارگان تناسلی در S.s. کوچکتر

سوال ۳۳ - کدامیک از انگل‌های زیر فاقد میزبان واسط دوم است؟

- الف) فاسیولا ژیگانتیکا
- ب) پاراگونیموس وسترمانی
- ج) دیکروسلیوم دندریتیکوم
- د) اکینوستوما ایلوکانوم

سوال ۳۴ - تخم شیستوزوما اینترکالاتوم با کدام روش رنگ آمیزی زیر از تخم شیستوزوما هماتوبیوم تمیز داده می‌شود؟

- الف) زیل نیلسون
- ب) گیمسا
- ج) تریکروم
- د) هماتوکسیلین