

سوال ۴۵ - تفاوت تریکوموناس واژینالیس و تریکوموناس تناکس کدام مورد است؟

- الف) اندازه دو تک یاخته (ب) تعداد تاژک (ج) آگزوستیل (د) تعداد هسته

سوال ۴۶ - محیط کشت مناسب برای تکثیر تریکوموناس واژینالیس کدام مورد است؟

- الف) اشنايدر (ب) لوفلر (ج) دیاموند (د) آگار خون دار

سوال ۴۷ - مهم ترین ایمونوگلوبولین در جلوگیری از اتصال آنتامبا به سلول های میزبان کدام است؟

- الف) IgG (ب) IgA (ج) IgE (د) IgM

سوال ۴۸ - با کدام روش زیر می توان سه آمیب آنتامباهیستولیتیکا، آنتامبادیسپار و آنتامباموشکوفسکی را از یکدیگر افتراق داد؟

- الف) روش های میکروسکوپی
ب) کشت در محیط گزنیک
ج) واکنش زنجیره ای پلیمرز
د) ایمونوفلورسانس غیرمستقیم

سوال ۴۹ - در تشخیص گونه های ژیا ردیا از کدام ویژگی مرفولوژیکی استفاده می شود؟

- الف) مدین بادی (ب) تعداد هسته (ج) شکل هسته (د) دیسک کننده

سوال ۵۰ - گزینه های زیر در مورد کیلوماستیکس مسنیلی صحیح است، به استثناء:

- الف) درسکوم و کولون زندگی می کند.
ب) اندازه تروفوزوئیت ۶ تا ۲۶ میکرومتر است.
ج) واجد ۳ تاژک و یک سیتوستوم است.
د) کیست آن تک هسته ای و لیمویی شکل است.

سوال ۵۱ - علامت تیپیک بالانتید یازیس روده ای در انسان کدام مورد زیر است؟

- الف) استئاتوره (ب) دیسانتری (ج) آبسه کبدی (د) پنومونی

سوال ۵۲ - کدام گزینه در مورد آنتامباهیستولیتیکا صحیح است؟

- الف) بیماری از طریق خوردن تروفوزوئیت منتقل می شود.
ب) تروفوزوئیت در خارج از بدن به کیست تبدیل می شود.
ج) تروفوزوئیت متحرک در مدفوع اسهالی گرم و تازه دیده می شود.
د) کیست تک یاخته در آب آشامیدنی کلرینه از بین می رود.

سوال ۵۳ - تک یاخته های زیر در روده باریک دیده می شوند، به استثناء:

- الف) ژیا ردیا لامبلیا (ب) ایزوسپورابی (ج) سیکلوسپورا کایه تانسیس (د) دی آنتامبا فراژیلیس