

سوال ۵۴ - عفونت با کدام یک از تک یاخته های زیر معمولا در انسان بدون علامت و خود محدود شونده است؟
 الف) ایزوسپورا بلی (ب) بابریا دایورجنس (ج) پلاسمودیوم مالاریه (د) تریپانوزوما گامبینس

سوال ۵۵ - انسان با خوردن کدام فرم به سارکوسیستیس مبتلا می شود؟
 الف) اووسیست رسیده (ب) اسپوروسیست (ج) کیست نسجی (د) کیست کاذب

سوال ۵۶ - برای تشخیص عفونت توکسوپلاسمایی کدام یک از روش های زیر متداول است؟
 الف) روش مستقیم (ب) تلقیح به حیوان حساس (ج) کشت انگل (د) روش های سرولوژی

سوال ۵۷ - اووسیست کوکسیدیاهای زیر دی اسپوریک - تترازوئیک می باشند، به استثناء:
 الف) سیکلوسپورا (ب) توکسوپلازما (ج) سارکوسیستیس (د) ایزوسپورا

سوال ۵۸ - ابتدا به توکسوپلاسموز در کدام مرحله از نظر ایجاد توکسوپلاسموز مادرزادی خطرناک تر است؟
 الف) سه ماهه قبل از بارداری
 (ب) سه ماهه اول بارداری
 (ج) سه ماهه دوم بارداری
 (د) سه ماهه سوم بارداری

سوال ۵۹ - در توکسوپلاسموز مادرزادی معمولا علایم زیر دیده می شوند، به استثناء:
 الف) هیدروسفالی (ب) میکروسفالی (ج) کلسیفیکاسیون مغزی (د) میوکارдит

سوال ۶۰ - کدام یک از کوکسیدیاهای روده ای انسان در چرخه زندگی خود دارای ۲ نوع شیزونت است؟
 الف) سارکوسیستیس (ب) ایزوسپورا (ج) کریپتوسپوریدیوم (د) توکسوپلازما

سوال ۶۱ - مهم ترین نقش اپیکال کمپلکس در توکسوپلازما گوندی ای چیست؟
 الف) تکثیر انگل به طریق آندودیوژنی
 (ب) ورود انگل به داخل سلول
 (ج) مقاومت به سیستم ایمنی
 (د) تحریک تبدیل تاکی زوئیت به برادی زوئیت

سوال ۶۲ - کدام مورد درباره کالا آزار صحیح است؟
 الف) افزایش لوکوسیت و کاهش گاماگلوبولین
 (ب) افزایش لوکوسیت و افزایش گاماگلوبولین
 (ج) کاهش لوکوسیت و کاهش گاماگلوبولین
 (د) کاهش لوکوسیت و افزایش گاماگلوبولین

سوال ۶۳ - علامت رومانا (Romana's sign) در کدام بیماری مشاهده می شود؟
 الف) خواب (ب) شاگاس (ج) کالا آزار (د) اسپوندیا