

سوال ۹۴ – در کدامیک از موارد زیر آمبليویی معمولاً ایجاد نمی‌گردد؟

- (د) آنیزومتروپی      (ب) فلچ عصب IV      (ج) فلچ عصب VI      (الف) فلچ عصب III

سوال ۹۵ – حالت نیستاگموس در سندروم Nystagmus Blockage چگونه است؟

- (الف) همراه با اگزوتروپی  
 (ب) در افزایش adduction می‌یابد  
 (ج) با کاهش میزان ایزوتروپی دامنه نیستاگموس افزایش می‌یابد  
 (د) نیستاگموس عمودی است

سوال ۹۶ – تشخیص Leber's congenital Amaurosis کدامیک از موارد زیر است؟

- (د) ERG      (ج) VEP      (ب) B-Scan      (الف) CSF

سوال ۹۷ – هدف اصلی تکنیک فیوزنی دایره‌های رنگی Chiastopic چیست؟

- (الف) افزایش PRN      (ب) افزایش تطابق تقاربی      (ج) افزایش فیوزنی تقاربی      (د) افزایش MEM

سوال ۹۸ – هدف اصلی کدامیک از موارد زیر در انجام تمرین تقاربی برای مانیتور کردن سوپرشن بوسیله Bar و پریزم Reader است؟

- (الف) Vergence Rock  
 (ب) Proximal Vergence  
 (ج) Fusional Vergence  
 (د) Accommodation Vergence

سوال ۹۹ – تمرین با Single Aperture Rule در کدامیک از موارد زیر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

- (الف) تقارت بیش از حد  
 (ب) کمبود تقاربی و اگزوفوریایی اولیه  
 (ج) تبعید بیش از حد  
 (د) کمبود تبعیدی و ایزو فوریایی اولیه

سوال ۱۰۰ – هنگام استفاده از فیلتر Neutral density چه میزان کاهش حدت بینایی مؤید آمبليوپی فانکشنال است؟

- (د) ۴۵ درصد      (ب) کمتر از ۲۰ درصد      (ج) ۲۰ تا ۵۵ درصد      (الف) ۵۵ درصد

سوال ۱۰۱ – عضله گرفتار در انحراف هایپر در چشم راست که در چرخش به چپ و Tilt به راست افزایش می‌یابد کدام است؟

- (د) LIO      (ج) LSO      (ب) RSO      (الف) RIR