

سوال ۱۰۹ - در مورد میکروتروپیا کدام ویژگی درست نیست؟

- الف) منوفیکساسیون (ب) عدم دید بعد (ج) آمبلیوپی (د) فیوژن محیطی

سوال ۱۱۰ - در بررسی تکامل بینایی نوزادان:

- الف) پتانسیل‌های برانگیخته بینایی نسبت به تست‌های رفتاری تکامل سریع‌تری را نشان می‌دهند.
 ب) بر اساس تست‌های رفتاری، تکامل بینایی نوزادان تا شش ماهگی به سطح بالغین می‌رسد.
 ج) پتانسیل‌های برانگیخته بینایی حداکثر تغییرات را در ماه ششم زندگی نشان می‌دهند.
 د) بر اساس تست‌های رفتاری، بینایی نوزادان در سه ماهگی یک سیکل بر درجه است.

عینک طبی

سوال ۱۱۱ - برای کدامیک از شکل اصلی صورت می‌توان هر نوع فریمی را انتخاب کرد؟

- الف) مربعی (ب) مستطیلی (ج) دایره‌ای (د) بیضی

سوال ۱۱۲ - مقدار بزرگنمایی عینک $1.04 \text{ Spectacle Magnification (SM)}$ نشان دهنده چیست؟

- الف) ۴ درصد کوچک‌نمایی (ب) ۴ درصد بزرگنمایی (ج) ۴ درصد قدرت تلسکوپ (د) مولفه توان ۴ درصد

سوال ۱۱۳ - در چه شرایطی در تجویز عدسیهای با دیوپتر بالا، فاصله محورهای بینایی (PD) نزدیک محاسبه‌ای و اندازه‌گیری شده برابر است؟

- الف) PD نزدیک از روی عدسی تجویز شده دور اندازه‌گیری شود
 ب) PD دور از روی عدسی تجویز شده نزدیک اندازه‌گیری شود
 ج) PD دور بعلاوه ۳ میلی‌متر
 د) PD نزدیک با PD متر اندازه‌گیری شود

سوال ۱۱۴ - برای تمیز کردن عدسی پلی‌کربنات‌ها از چه مواد نمی‌توان استفاده کرد؟

- الف) Citrus (ب) استون (ج) ساینده‌ها (د) اولتراسونیک

سوال ۱۱۵ - کدامیک از پدهای بینی زیر برای انواع پدهای پیچی و فشاری قابلیت نصب دارد؟

- الف) Logic (ب) Acetate (ج) وینیل (د) سیلیکونی

سوال ۱۱۶ - برای کودکان کدام ویژگی را در ساخت عینک بایستی رعایت شود؟

- الف) عدسی‌های Trivex بایستی استفاده شود.
 ب) فریم‌های نایلونی کاربرد بیشتری دارد.
 ج) فریم‌های زیر نخی مطلوب‌تر است.
 د) عدسی‌های کراون بهترین انتخاب است.

سوال ۱۱۷ - عدسی‌های Atorics در چه مواردی استفاده نمی‌شود؟

- الف) عدسی‌های تک دید (ب) عدسی‌های پروگرسو (ج) عدسی‌های چند کانونه (د) عدسی‌های اسفر-سیلندر