

سوال ۵۹ - در صورتی که تنها فاکتور موثر بر تیزی بینی تفرق باشد، کدام فرد تیزی بینی بهتری دارد؟

الف) فرد با قطر مردمک $4/6$ میلی‌متر

ب) فرد با قطر مردمک $2/3$ میلی‌متر

ج) فرد با قطر مردمک $1/1$ میلی‌متر

د) فرد با قطر مردمک 2 میلی‌متر

سوال ۶۰ - چنانچه در تست آلن بچه‌های قبل از سنین مدرسه، کودکی قادر به تشخیص کارت در فاصله حداکثر ۱۰ فوتی باشد، دید معادل اسنلن او چقدر است؟

الف) $20/400$ (د)

ب) $20/60$ (ج)

ج) $20/40$ (ب)

د) $20/120$ (الف)

بیماری‌های چشمی

سوال ۶۱ - شالازیون عبارت است از:

الف) واکنش التهابی غدد مول وزایس، استریل، غیرگرانولوماتوس، مزمن

ب) واکنش حاد غدد میبومین، غیراستریل، غیرگرانولوماتوس

ج) کیست غدد میبومین، مزمن، استریل، با یک واکنش گرانولومانوس

د) واکنش غیرالتهابی غدد زایس، استریل، گرانولوماتوس، مزمن

سوال ۶۲ - کدام یک از موارد زیر در مرحله فعال تراخیم دیده نمی‌شود؟

الف) تشکیل پانوس

ب) فولیکول و پاپی

ج) اسکارهای خطی

د) ترشحات موکوپورولنت

سوال ۶۳ - در بیماری‌های بافت همبند (کلاژن) کراتیت بیشتر از نوع:

الف) مرکزی همراه با افزایش ضخامت

ب) محیطی همراه با افزایش ضخامت

ج) مرکزی همراه با نازکی قرنیه

د) محیطی همراه با نازکی قرنیه

سوال ۶۴ - کدام یک از موارد ذیل جزو سندرم‌های Iridocorneal Endothelial نیست؟

الف) آتروفی پیشرونده ایریس

ب) سندرم فوکس

ج) سندرم گوگان ریز

د) سندرم چند لر

سوال ۶۵ - کدام یک از موارد زیر از عوارض شایع یوئیت بینابینی نیست؟

الف) کندگی شبکه

ب) تشکیل ماکولار اپی رتینال

ج) کاتاراکت و گلوکوم

د) خونریزی و پتره