

سوال ۱۱۳ - در کدامیک از موارد زیر قرصهای خوراکی پیشگیری از بارداری نباید مورد استفاده قرار گیرد؟

- الف) زنان سیگاری بالای ۳۵ سال
 ب) زنان با خونریزی زیاد در موقع پریودماهانه
 ج) زنانی که هنوز زایمان نکرده اند
 د) در فاصله ۲ سال از زایمان قبلی

سوال ۱۱۴ - ایمن سازی خوب باید دارای کلیه شرایط زیر باشد، به استثنای:

- الف) مرتبط با یافته های اپیدمیولوژیک باشد.
 ب) شواهد پاتولوژیک تاثیر واکنس وجود داشته باشد.
 ج) در نظر قابلیت اجرا امکان پذیر باشد.
 د) از نظر افراد جامعه مقبول باشد.

سوال ۱۱۵ - مهمترین علت مرگ ناشی از بارداری و زایمان در سطح جهان کدام مورد زیر است؟

- الف) خونریزی شدید ب) عفونت ج) اکلامپسی د) سقط نامطمئن

سوال ۱۱۶ - پیشگیری از ظهور یا رشد عوامل خطر در جمعیت هایی که هنوز عوامل خطر در آنها مشاهده نشده است یادآور کدامیک از سطوح پیشگیری است؟

- الف) مقدماتی (Primordial) ب) اولیه (Primary) ج) ثانویه (Secondary) د) ثالثه (Tertiary)

سوال ۱۱۷ - همه موارد زیر از علل مرگ نوزادان (صفر تا ۴ هفته) می باشد، به استثنای:

- الف) سوء تغذیه ب) بیماریهای همولیتیک ج) وضعیت جفت و بندناف د) صدمات حین زایمان

سوال ۱۱۸ - کلیه موارد زیر از اقدامات پیشگیری و کنترل آلودگی هوا محسوب می شوند، به استثنای:

- الف) تقویت استانداردهای مربوط به کیفیت هوای محیط بسته
 ب) جایگزین کردن تکنولوژی هایی که آلودگی کمتری ایجاد می کنند
 ج) بوجود آوردن فضای سبز بین مناطق صنعتی و مسکونی
 د) کنترل دی اکسید سولفور دود آگزوز خودروهای بنزینی

سوال ۱۱۹ - در حال حاضر کلیه هیاتیت های زیر از طریق واکنس، قابل پیشگیری هستند، به استثنای:

- الف) A ب) B ج) D د) E

سوال ۱۲۰ - کدامیک از موارد زیر پیشگیری سطح دوم به حساب می آید؟

- الف) جراحی انحراف بینی ب) استفاده از عینک طبی ج) کاشتن دندان د) درمان دارویی حصبه