

سوال ۱۰۰ - جهت بیماری که دچار محدودیت در ۱۰ درجه انتهایی اکستانسیون زانو می‌باشد، کدام تکنیک زیر را برای رفع محدودیت حرکتی پیشنهاد می‌کنید؟

- (الف) Lateral glide of patella
- (ب) Inferior glide of patella
- (ج) Posterior glide of tibia
- (د) Anterior glide of tibia

سوال ۱۰۱ - در Limbic System Dysfunction کدامیک از عضلات زیر کمتر درگیر می‌شوند؟

- (الف) Pelvic Floor Muscle
- (ب) Lower Trapezius
- (ج) S.C.M
- (د) Lumbar Erector Spine

سوال ۱۰۲ - بیماران مبتلا به پارکینسون چگونه از استراتژی‌های حرکتی جهت حفظ بالانس خود استفاده می‌کنند؟

- (الف) از استراتژی مج پا سریع‌تر استفاده می‌کنند.
- (ب) از استراتژی هیپ سریع‌تر استفاده می‌کنند.
- (ج) قادر به استفاده از استراتژی‌های حرکتی جهت حفظ بالانس نیستند.
- (د) از هر دو استراتژی مج پا و هیپ به صورت ترکیبی استفاده می‌کنند.

سوال ۱۰۳ - هدف اصلی استفاده از Dual Task در بیماران مبتلا به ضایعات اعصاب مرکزی چیست؟

- (الف) افزایش Cognitive demands
- (ب) افزایش Postural control demands
- (ج) ارزیابی تقابل اثر Cognitive demands و Postural control demands
- (د) افزایش attention بیمار

سوال ۱۰۴ - کدام یک از مدالیتی‌های زیر برای کاهش درد مفصل مبتلا به التهاب حاد توصیه می‌شود؟

- (الف) دیاترمی موج کوتاه
- (ب) میکروویو دیاترمی
- (ج) گالوانیزاسیون آندی
- (د) گالوانیزاسیون کاتدی

سوال ۱۰۵ - در درمان نوری شیمیایی بیمار مبتلا به ویتیلیگو موضعی، الگوی صحیح در جلسه اول کدام است؟

- (الف) UVA با ۷۵٪ بیودوز
- (ب) UVB با ۲۵٪/۷۵٪ بیودوز
- (ج) UVA با دو برابر بیودوز
- (د) UVC برابر بیودوز

سوال ۱۰۶ - کاربرد کدام یک از مدالیتی‌های زیر در بیماران مبتلا به سندروم رفلکس سمتیک (RSD) ممنوعیت دارد؟

- (الف) گرمای سطحی
- (ب) TENS
- (ج) گرمای عمقی
- (د) Ice pack