

سوال ۱۰۷ - بهترین روش راه رفتن بعد از تعویض کامل مفصل ران با پروتز غیرسیمانی (Porous coated) در ۶ هفته اول کدام است؟

- الف) Toe touch (ب) بدون تحمل وزن (ج) با تحمل نسبی وزن (د) Four point

سوال ۱۰۸ - زنجیره سینماتیکی مناسب برای تمرین درمانی مفصل تیئوفمورال و پتئوفمورال مبتلا به آرتروز به ترتیب از راست به چپ کدام است؟

- الف) زنجیره باز - زنجیره بسته
ب) زنجیره بسته - زنجیره باز
ج) زنجیره باز - زنجیره باز
د) زنجیره بسته - زنجیره بسته

سوال ۱۰۹ - در یک بیمار مبتلا به کوادری پلژی C4 کدامیک از موارد زیر صحیح نمی باشد؟

- الف) قادر به استفاده از ویلچر می باشد.
ب) قادر به غذا خوردن می باشد.
ج) در لباس پوشیدن مستقل می باشد.
د) در استحمام کردن دچار مشکل می باشد.

سوال ۱۱۰ - تقویت کدام یک از عضلات زیر در کاهش علائم بیماری Osgood-Schlatter می تواند موثر باشد؟

- الف) Quadriceps (ب) Hamstring (ج) Tibialis Anterior (د) Gluteus. Max.

ارتز و پروتز

سوال ۱۱۱ - Thumb spica splint در همه موارد زیر تجویز می گردد، بجز:

- الف) اسپاستی سیتی عضله Flexor pollicis longus
ب) اسپاستی سیتی عضله Abductor pollicis longus
ج) درگیری عصب Median
د) درگیری عصب Ulnar

سوال ۱۱۲ - هدف از تجویز Posterior leaf spring جبران فلج عضلات در کدام مورد می باشد؟

- الف) دورسی فلکسورها در Loading response
ب) دورسی فلکسورها در Mid stance
ج) پلانتر فلکسورها در Loading response
د) پلانتر فلکسورها در Mid stance

سوال ۱۱۳ - در بیماری با درد مزمن ناشی از Facet syndrome پوزیشن مناسب مهره های کمری در درون ارتز چیست؟

- الف) Neutral (ب) Flexion (ج) Extension (د) Hyper extension

سوال ۱۱۴ - هدف استفاده از ارتزهای مفصل دار در افراد مبتلا به سندرم درد پتئوفمورال کنترل کدام حرکت می باشد؟

- الف) اکستنشن زانو (ب) فلکشن زانو (ج) اداکشن واکستنشن زانو (د) اداکشن و فلکشن زانو