

سوال ۲۹ - هنگام تست قدرت عضلات فلکسور ران در درجه Fair کدام عبارت صحیح است؟

- الف) بروز Lat. Rot. نشان دهنده قوی تر بودن تنسور فاسیالاتا است
 ب) بروز Med. Rot. نشان دهنده قوی تر بودن سارتریوس است.
 ج) بروز Lat. Rot. نشان دهنده قوی تر بودن سارتریوس است.
 د) شیفت تنه به سمت عقب نشان دهنده قوی تر بودن رکتوس فموریس است.

سوال ۳۰ - در کدام وضعیت، عضله همسترینگ علی رغم طول طبیعی کوتاه به نظر می رسد؟

- الف) تیلت خلفی لگن
 ب) تیلت قدامی لگن
 ج) چرخش لگن به سمت مقابل
 د) کاهش لوردوز کمر

سوال ۳۱ - وضعیت شانه بیمار هنگام شروع تست قدرت تراپز میانی چگونه است؟

- الف) ایداکسیون ۹۰ درجه و چرخش خارجی
 ب) فلکسیون ۹۰ درجه و چرخش خارجی
 ج) ایداکسیون ۹۰ درجه و چرخش داخلی
 د) فلکسیون ۹۰ درجه و چرخش داخلی

سوال ۳۲ - در آزمون درجه ۲ سراتوس آنتریور، چه عضله ای ممکن است جایگزین شود؟

- الف) پکتورالیس ماژور (ب) پکتورالیس مینور (ج) ساب اسکاپولاریس (د) رومبویدها

سوال ۳۳ - کدام یک از موارد زیر در فلکسیون طرفی تنه کمترین نقش را دارد؟

- الف) فیبرهای خارجی عضله مایل خارجی شکم
 ب) فیبرهای خارجی عضله مایل داخلی شکم
 ج) کوادراتوس لومبروم
 د) عرضی شکم

سوال ۳۴ - در آزمون Leg lowering برای ارزشیابی قدرت قسمت پایین فلکسورهای تنه در صورتی که لوردوز کمری

در ۳۰ درجه فلکسیون ران شروع به افزایش یابد چه درجه ای داده می شود؟

- الف) Good+ (ب) Good- (ج) Good (د) Fair+

سوال ۳۵ - وضعیت اندام پایینی مبتلا به کنتراکچر اداکتورها در حالت ایستاده چگونه است؟

- الف) فلکشن و چرخش خارجی ران مبتلا
 ب) پلاتارفلکشن در اندام مبتلا
 ج) فلکشن زانوی اندام مبتلا
 د) اداکشن و چرخش داخلی اندام مقابل

مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی نخبگان

دکتری تخصصی کارشناسی ارشد کاردانی به کارشناسی

مجموعه زیست شناسی

زیر نظر دکتر دعایی

۰۲۱-۶۶۹۰۲۰۶۱ ۰۱۳۱-۳۲۳۸۰۰۲