

سوال ۳۹ - از کدام تست زیر برای تمایز واریته استلاتوئیده کاندیدا آلیکنس استفاده می‌شود؟

- الف) اوره آز (ب) جرم تیوب (ج) کلامیدوکونیدی (د) جذب سوکروز

سوال ۴۰ - کدام جنس از خانواده کریپتوکوکاسه توانائی تخمیر قندها را دارد؟

- الف) مالاسزیا (ب) تریکوسپورون (ج) کریپتوکوکوس (د) رودوتورولا

سوال ۴۱ - کدام شکل بالینی کچلی پا شایع‌تر است؟

الف) Papulosquamous hyperkeratotic

ب) Subacute or Vesicular

ج) Acute ulcerative vesiculopustular

د) Chronic intertriginous

سوال ۴۲ - کدام گزینه زیر در مورد پروتوکتا (Prototheca) صادق می‌باشد؟

- الف) قارچ دو شکلی (ب) مخمر حقیقی (ج) باکتری رشته‌ای (د) جلبک

سوال ۴۳ - برای تشخیص سریع *Candida dubliniensis* کدام یک از روشهای زیر مناسب‌تر است؟

الف) Fermentation

ب) Assimilation

ج) Chlamydoconidia production

د) Germ tube test

سوال ۴۴ - اختلاف *Botryomycosis* و *Mycetoma* در کدام گزینه زیر می‌باشد؟

الف) وجود سینوس‌های ترشحاتی متعدد

ب) وجود گرانول

ج) وجود تورم

د) عامل اتیولوژیک

سوال ۴۵ - استفاده از آنتی بیوتیک‌های زیر جهت ممانعت از رشد باکتری در محیط‌های کشت قارچ

شناسی ارجحیت دارد؟

- الف) کلرامفنیکل (ب) استرپتومايسين (ج) سیکلوهگزامید (د) تتراسیکلین

سوال ۴۶ - برای تشخیص تریکوفایتون روبروم فاقد پیگمان از تریکوفایتون منتاگروفایتیس همه تست‌های زیر

کاربرد دارد بجز؟

- الف) اوره آز (ب) جذب سوریتول (ج) سوراخ کردن مو (د) کشت در محیط PDA