

سوال ۷ - بیماری مراجعه کرده است که میزان فشار جریان هوای (Air flow pressure) وی ناکافی گزارش شده است. این مقدار حداکثر چند سانتیمتر آب بوده است؟

- الف) ۱۲ (ب) ۵ (ج) ۹ (د) ۱۵

سوال ۸ - در توصیف و بررسی موج‌های الکتروگلووتوگراف (EGG) یک مرد ۴۵ ساله نوشته شده است: "... و فقدان موج‌های یک شکل و یکسان ...". با توجه به این توصیف کیفیت صدای بیمار چگونه است؟

- الف) Tremor (ب) Breathy (ج) Falsetto (د) Hoarse

سوال ۹ - برای بهبود هر دو جنبه کیفیت صدا و وضوح گفتار (تولید) در بیمار مبتلا به پارکینسون، "بون و همکاران" کدام روش تسهیل کننده را پیشنهاد می‌کنند؟

الف) Tongue protrusion

ب) Relaxation & massage

ج) Respiration train

د) Metronome pacing

سوال ۱۰ - کدام یک از روش‌های تسهیل کننده در صوت درمانی موجب ایجاد حرکت ریلکس و بیشتر شدن حالات Synergic در اندام‌های گفتاری (و حنجره) می‌شود؟

- الف) Chant talk (ب) Chewing (ج) Head positioning (د) Relaxation

سوال ۱۱ - برای تثبیت زیر و بمی جدید، آسیب شناس گفتار از بیمار می‌خواهد تا فهرستی از واژه‌ها را با زیر و بمی جدید بیان نماید. این واژه‌ها باید چه ویژگی داشته باشند؟

الف) با واکه شروع شوند

ب) کاملاً واگذار باشند

ج) بافت یکسان داشته باشند

د) بافت خیشومی نداشته باشند

سوال ۱۲ - یک آسیب شناس گفتار قصد دارد از روش Glottal fry برای درمان اختلال صوت بیمار خود استفاده نماید. برای این که بیمار این روش را به راحتی اجرا نماید، کدام یک از اقدامات زیر را باید انجام دهد؟

الف) /i/ را آرام تولید نموده و بعد تغییر بدهد.

ب) در وضعیت ریلکس قرار گیرد و نفس عمیق بکشد.

ج) نیمی از هوا را تخلیه نموده و بعد صدا سازی نماید.

د) سر را پائین انداخته، به زمین نگاه کرده و آواسازی بکند.