

سوال ۱۹ - در یک بیمار بزرگسال مبتلا به پرکاری صوتی، کدام وضعیت سر می تواند سبب تولید راحت تر صوت شود؟

الف) Neck flexed downward

ب) Straight ahead

ج) Head rotated toward left-right

د) Neck extended forward

سوال ۲۰ - در بیماران مبتلا به Functional aphonia، استفاده از کدام یک از تکنیک های تسهیل کننده زیر در گام های اول صوت درمانی توصیه می شود؟

الف) Auditory feedback      ب) Counseling      ج) Redirected phonation      د) Hierarchy analysis

سوال ۲۱ - مهم ترین عامل موفقیت در صوت درمانی بیماران مبتلا به سرطان حنجره که جراحی یا روش های پرتودرمانی دریافت کرده اند، چیست؟

الف) میزان نزدیک شدن چین های صوتی

ب) مقدار موج مخاطی چین های صوتی

ج) الگوی انسداد چین های صوتی هنگام آواسازی

د) مقدار چرخش افقی چین های صوتی

سوال ۲۲ - پسری ۱۴ ساله مبتلا به هایپرنیزالیتی با تشخیص انسداد ناکافی کامی - حلقی به گفتار درمانی مراجعه کرده است. مناسب ترین توصیه درمانی برای وی چیست؟

الف) برنامه گفتار درمانی را آغاز کند.

ب) برای جراحی به پزشک مراجعه نماید.

ج) پس از جراحی جهت گفتاردرمانی مراجعه نماید.

د) برای دریافت پروتز اقدام نماید.

سوال ۲۳ - کدام لایه چین های صوتی در ایجاد موج مخاطی (Mucosal wave) دخالت می کند؟

الف) Deep lamina      ب) Intermediate      ج) Surface cover      د) Vocalic muscle

سوال ۲۴ - مرد ۵۰ ساله ای با گرفتگی صدا مراجعه نموده است که از درد ناحیه حنجره، خراب شدن صدا بعد از صحبت زیاد، بم بودن صدا شکایت دارد. با توجه به نتایج لارنگوسکپی و ارزیابی تکمیلی تشخیص Contact ulcer داده شد. چه علامت دیگری این تشخیص را تأیید می کند؟

الف) دستگاه گوارش سالم و بدون مشکل باشد.

ب) بخش مخاطی حنجره صورتی رنگ باشد.

ج) رابط قدامی تحت فشار و قرمز باشد.

د) دردی که به گوش سرایت می کند.

**مرکز تخصصی خدمات آموزشی گروه پزشکی نخبگان**

**دکتری تخصصی      کارشناسی ارشد      کاردانی به کارشناسی**

**مجموعه زیست شناسی**

**زیر نظر دکتر دعایی**

۰۲۱-۶۶۹۰۲۰۶۱      ۰۱۳۱-۳۲۳۸۰۰۲