

سوال ۱۹ - در مورد F LT3 Mutation همه جملات زیر صحیح است، بجز:

- (الف) در AML از موتاسیون های شایع است
- (ب) در پیش بینی Relapse پرونوسیک فاکتور مهمی است
- (ج) برنامه درمانی اصلی بیمار روی آن تنظیم می شود
- (د) به عقیده ای FLT3 مثبت آینده پیوند را در این گروه بهتر می کند

سوال ۲۰ - در CBC از بیماری نتایج زیر گزارش گردیده است. محتمل ترین تشخیص چیست؟

Hb=14 gr/dl, Hct=24.9 % , MCV=111.7 fl, RBC=2.23×10⁶ µl

MCH=64.6 fg, MCHC=57.8 gr/dl , Plt= 150×10³ µl

- (الف) کرایوگلوبولین - کرایوفیرینوژنی
- (ب) بیماری آگلوتینین سرد
- (ج) آنمی مگالوبلاستیک
- (د) هیپرلیپیدمی

سوال ۲۱ - بر اساس تقسیم بندی WHO (2008) کدام یک از انواع اختلالات لنفوپرولیفراتیوزیر نمی تواند با منشاء سلول T باشد؟

- (الف) CLL (لوسمی لنفوسیتیک مزمن)
- (ب) میکوزیس فونگوئید
- (ج) لوسمی پرولنفوسیتیک
- (د) سندرم سزاری

سوال ۲۲ - پسر بچه ۶ ساله با تب، بدون علائم تنفسی و WBC=30/000 µl (Neut 10% , lym 90%) مراجعه نموده است. در بررسی به عمل آمده لنفوسیتها از نوع بالغ و بدون آتی پی و با منشاء سلول T می باشند. کدام یک از تشخیصهای زیر محتمل تر می باشد؟

- (الف) مونونوکلئوز عفونی
- (ب) عفونت کوکسازی ویروس
- (ج) CLL (لوسمی لنفوسیتیک مزمن)
- (د) عفونت سیاه سرفه

سوال ۲۳ - پسر بچه ۸ ساله با سابقه مثبت فامیلی در مادر با خونریزیهای مکرر بینی مراجعه نموده است در آزمایشها انجام گرفته نتایج زیر گزارش شده است. محتمل ترین تشخیص چیست؟

PT(ratio)=0.97, PTT(ratio) = 1.74, FVIII= 5 U/dl, VWF Ag<1 U/dl
VWF: RCO <3 U/dl, Multimer= Abnormal

- | | | | |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| A | B | C | D |
| هموفیلی A | VWD تیپ I | VWD تیپ II | VWD تیپ III |