

۶۵ - در انجام فرآیند پرستاری و آموزش به مادر باردار، فواصل مراجعه به درمانگاه کنترل بارداری (پره ناتال) چگونه

توصیه می‌شود؟

- (الف) تا هفته ۲۸ هر چهار هفته یک بار، از ۲۸ تا ۳۶ هفتگی هر دو هفته یک بار، از هفته ۳۶ تا زایمان هر هفته
- (ب) در نیمه اول بارداری (۲۰ هفته اول) هر چهار هفته یک بار و بعد از آن تا زایمان هر دو هفته یک بار
- (ج) تا هفته ۲۸ هر دو هفته یک بار، از ۲۸ هفتگی تا زایمان هر هفته یک بار
- (د) فاصله زمانی مراجعه به درمانگاه بنا به سلیقه و تمایل مادر می‌باشد

۶۶ - جفت از هفته چندم بعد از لقاح، کاملاً تشکیل شده و عملکرد خود را انجام می‌دهد؟

- (د) دهم
- (ج) نهم
- (ب) هفتم
- (الف) چهارم

۶۷ - هورمون مترشحه از جفت کدام است؟

- (الف) پروژسترون - پرولاکتین - h.P.L
- (ب) پرولاکتین - T.S.H - h.C.G
- (ج) پرولاکتین - اکسی توسین - T.S.H
- (د) استروژن - پروژسترون - h.C.G

۶۸ - جهت مراقبت شدیدتر قبل از زایمان، پرستار در آموزش به مددجوی باردار، کدام مشکل را گوشزد می‌کند؟

- (الف) مولتی پار بودن مادر (بالای دو فرزند)

- (ب) بیماری‌های مزمن (فسار خون بالا، دیابت و...) و سابقه نازایی

- (ج) آرترو روماتوئید حاد و مزمن

- (د) واریس و کرامپ در پاها

۶۹ - ارتفاع قله رحم مادر بارداری ۲۸ سانتی‌متر است. پرستار سن حاملگی (سن جنینی) را براساس روش مک دونالد

(بر حسب ماه) را چه عددی تخمین می‌زند؟

- (۹) ۵
- (ج) ۸
- (ب) ۷
- (الف) ۶

۷۰ - جهت اندازه‌گیری و ارزیابی میزان آلفافیتوپروتئین (AFP)، به کدام طریق متوجه می‌شوند؟

- (الف) فقط مایع آمنیوتیک
- (ب) ترشحات حلق
- (ج) سرم خون مادر یا مایع آمنیوتیک
- (د) سرم خون بازینال

۷۱ - کدام مورد زیر، از عوارض شایع بی‌حسی اپی دورال در زایمان است؟

- (د) خستگی
- (ج) کرامپ شکمی
- (ب) تهوع
- (الف) هیپوتانسیون

۷۲ - دیستوژی (Dystocia) به چه معنی است؟

- (الف) به هرگونه اختلال هورمونی منجر به ناباروری در زنان

- (ب) به هر گونه زایمان سخت طولانی و غیرطبیعی

- (ج) نوعی شستشوی واژن بعد از مقابله غیرایمن

- (د) خونریزی واژینال شدید در بارداری

۷۳ - تزریق کدام واکسن در دوران بارداری مجاز است؟

- (د) کزان
- (ج) اوریون
- (ب) سرخچه
- (الف) سرخک

۷۴ - ۴۸ ساعت بعد از تولد نوزاد طبیعی، بروز زردی چه نام دارد؟

- (د) مادرزادی
- (ج) فیزیولوژیک
- (ب) پاتولوژیک
- (الف) ناشی از شیر مادر