

- ۳۶ - مصرف پروتئین سویا در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ باعث افزایش کدام گزینه می‌شود؟  
 ج) حساسیت به انسولین      ب) کلسترول LDL      د) اشتها  
 الف) کلسترول تام
- ۳۷ - مصرف مقادیر بالای اسیدهای چرب EPA و DHA (بالای ۴ گرم در روز) در مبتلایان به دیابت سطح سرمهی کدام گزینه را بالا می‌برد؟  
 د) تری گلیسرید      ج) کلسترول LDL      ب) کلسترول تام      الف) گلوکز
- ۳۸ - در رژیم کتوژنیک وضعیت تری گلیسرید و LDL به ترتیب چگونه است؟  
 د) کاهش - کاهش      ج) افزایش - افزایش      ب) کاهش - کاهش      الف) افزایش - کاهش
- ۳۹ - در مورد لپتین کدام درست است؟  
 الف) یک نوع آدیپوکین است  
 ب) میزان آن در خون مردان بیش از زنان است  
 ج) از بافت کلیوی نیز ترشح می‌شود  
 د) در ذخیره انرژی بی‌تأثیر است
- ۴۰ - کمیت و کیفیت کدام گزینه در شیر مادر مستقیماً با رژیم غذایی مادر شیرده ارتباط دارد؟  
 د) لاکتوز      ج) پروتئین      ب) کلسیم      الف) چربی
- ۴۱ - میزان توصیه شده (DRI) ویتامین D کدام گروه بیشتر است؟  
 د) کودکان زیر یک سال      ج) افراد بالای ۷۰ سال      ب) زنان باردار      الف) زنان شیرده
- ۴۲ - کدام گزینه در سندروم دامپینگ بهتر تحمل می‌شود؟  
 د) نشاسته      ج) دکستروز      ب) لاکتوز      الف) سوکروز
- ۴۳ - پیشگویی کننده اولیه انرژی مصرفی استراحت (REE) کدام است؟  
 د) میزان بافت مغز      ج) میزان بافت کبد      ب) توده چربی بدن      الف) توده بدون چربی بدن
- ۴۴ - کدام گزینه در مورد فیبرها درست است؟  
 الف) پره بیوتیک‌ها مواد غذایی قابل هضم هستند  
 ب) فروکتان‌ها دارای خواص پره بیوتیک هستند  
 ج) فیبر عملگرا (Functional Fiber) کربوهیدرات‌های قابل هضم هستند  
 د) پلی دکستروز فیبر عملگر است
- ۴۵ - در سطوح بالاتر از کدام نمایه توده بدن (BMI) به ترتیب (راست به چپ) درمان دارویی و جراحی برای چاقی مطرح می‌شود؟  
 د) ۳۵ ، ۲۵      ج) ۳۰ ، ۳۵      ب) ۴۰ ، ۳۰      الف) ۳۵ ، ۲۷
- ۴۶ - کاربرد کدام ویتامین در کاهش سطح فسفات خون در بیماران دچار نارسایی کلیه (ESRD) مفید است؟  
 د) نیاسین      ج) منادیون      ب) اسیداسکوربیک      الف) اسیدفولیک
- ۴۷ - کدام گزینه در گروه غذاهای با نمایه گلیسمی پایین قرار می‌گیرد؟  
 د) بیسکوئیت      ج) عدس      ب) نان گندم کامل      الف) برنج دانه بلند