

بهداشت، تغذیه مادر و کودک و تنظیم خانواده

- ۱- در منطقه‌ای تعداد کل موالید ۱۰۰ هزار، تعداد موالید زنده ۸۰ هزار است و تعداد مرگ مادر به علت خونریزی ۳ نفر، به علت اکلامپسی ۱ نفر و به علت زلزله ۴ نفر می‌باشد. نسبت مرگ و میر مادری **Maternal Mortality Ratio** در آن منطقه چند در صد هزار می‌باشد؟
- الف) ۴ (ب) ۵ (ج) ۸ (د) ۱۰
- ۲- حداقل فاصله بین نوبت سوم و چهارم واکسن سه گانه چند ماه می‌باشد؟
- الف) ۳ (ب) ۶ (ج) ۹ (د) ۱۲
- ۳- در افراد مبتلا به ایدز تجویز کدام واکسن ممنوع می‌باشد؟ (طبق دستورالعمل کشوری)
- الف) MMR (ب) ب ث ژ (ج) فلج اطفال (IPV) (د) دوگانه
- ۴- خانمی بدون سابقه قبلی ایمن‌سازی، یک بار در زمان ازدواج و بار دیگر در ماه هشتم بارداری واکسن دوگانه ویژه بزرگسالان دریافت نموده است. درصد محافظت وی در مقابل عفونت کزاز چقدر می‌باشد؟
- الف) صفر (ب) ۵۰ (ج) ۸۰ (د) ۹۵
- ۵- از ده هزار مورد تولد زنده رخ داده، ۵۰ مورد مرگ طی هفته اول، ۵۰ مورد مرگ بین ۲۸-۷ روز، ۳۰ مورد مرگ ۱۲-۱ ماهگی و ۲۰ مورد مرگ ۲۴-۱۲ ماهگی رخ داده است. میزان مرگ و میر شیرخواری چند در هزار تولد زنده می‌باشد؟
- الف) ۱۰ (ب) ۱۳ (ج) ۱۵ (د) ۲۰
- ۶- طبق دستورالعمل کشوری، فردی که عمل TL داشته است در صورت نداشتن درد از چند روز بعد از عمل می‌تواند رابطه زناشویی داشته باشد؟
- الف) ۷ (ب) ۱۰ (ج) ۱۴ (د) ۲۱
- ۷- مادری سقط عفونی داشته و مایل به استفاده از IUD می‌باشد. طبق دستورالعمل کشوری در صورت عدم تداوم علایم عفونت، از حداقل چند هفته بعد از سقط می‌توان برای او IUD گذاشت؟
- الف) ۶ (ب) ۸ (ج) ۱۰ (د) ۱۲
- ۸- طبق دستورالعمل کشوری، کدام یک از موارد زیر جزء موارد منع مصرف مطلق قرص‌های ضدبارداری ترکیبی می‌باشد؟
- الف) افسردگی بسیار شدید (ب) بیماری فعال کیسه صفرا (ج) نئوپلازی شدید سرویکس (د) فشار خون ۱۶۰/۱۱۰
- ۹- بخش عمده نیاز به آهن در دوران بارداری مربوط به کدام عامل زیر است؟
- الف) جنین و جفت
 ب) افزایش ویسکوزیته خون
 ج) افزایش قابل توجه پلاسما
 د) افزایش حجم کلی اریتروسیت‌های در گردش