

۹۶ - در گزارش ماموگرافی خانمی ضایعه‌ای در گروه ۴ یا ۵ (سیستم BI-RADS) تشخیص داده شده، اقدام بعدی چیست؟

- (الف) توصیه به پیگیری با فواصل کوتاه
- (ب) ارجاع جهت تشخیص بافتی
- (ج) معاینه پستان توسط افراد متخصص
- (د) بررسی تشخیصی بیشتر

نوزادان و مراقبت‌های مربوطه

۹۷ - سندروم رفتاری نوزادان به دنبال مصرف مهارکننده‌های انتخابی برداشت مجدد سروتونین مانند فلوکسیتین توسط مادر در بارداری تا چه زمانی برطرف می‌شود؟

- (الف) ۲۴ ساعت اول زندگی
- (ب) ۶ ساعت بعد از تولد
- (ج) ۲ هفته پس از تولد
- (د) پایان دوران نوزادی

۹۸ - در صورتی که جنین قبل از تولد، به دنبال احساس نیاز مادر معتاد به مصرف دارو، دچار محرومیت شود چه علایمی را نشان می‌دهد؟

- (الف) کاهش حرکات جنین
- (ب) افزایش فعالیت
- (ج) خواب آلودگی
- (د) کاهش ضربان قلب

۹۹ - کدام عبارت در خصوص بیماری‌های خونریزی دهنده ناشی از ویتامین K درست است؟

- (الف) نوزادانی که با شپر خشک تغذیه می‌شوند شناسی بالاتری نسبت به شیر مادرخواران دارند
- (ب) نوزاد مادران تحت درمان با فنوباربیتال در معرض خونریزی کشنده زودهنگام می‌باشد
- (ج) نوزادان ترم در معرض کمبود گذرای ویتامین K قرار نمی‌گیرند
- (د) اثر بخشی ویتامین K تزریقی، در پیشگیری از شروع دیرهنگام خونریزی کم می‌باشد

۱۰۰ - همه گزینه‌ها از عوامل خطر سپسیس باکتریال در نوزادان LBW است، بجز:

- (الف) کوریوآمنیونیت مادری
- (ب) عدم وجود طحال
- (ج) نژاد مادری-پدری
- (د) یوروپاتی انسدادی

۱۰۱ - در نوزاد با کاهش تحریک پذیری، کدام یک از علایم زیر مشاهده می‌شود؟

- (الف) بی ثباتی اتونومیک
- (ب) اختلال در تغذیه و ارتباط
- (ج) رنگ پریدگی دور دهان
- (د) لکه لکه شدن پوست