

۱۱۵ - کدام مورد در نوزاد تازه متولد شده غیرطبیعی است؟

- د) فونتال خلفی بزرگ ج) اریتم توکسیکم ب) خونریزی ملتحمه
 الف) تورم پستان

۱۱۶ - کلیه موارد زیر عامل خطر هیپربیلی روئینمی محسوب می‌شود، بجز:

الف) سفال هماتوم با کبوdí قابل ملاحظه

- ب) جنس مونث
 ج) نوزاد ماکروزووم مادر دیابتی
 د) سن مادر بیش از ۲۵ سال

۱۱۷ - در صورت ابتلای نوزاد به فلچ فرنیک کدامیک از اقدامات زیر درست می‌باشد؟

- الف) تشخیص قطعی با رادیوگرافی تایید می‌شود.
 ب) بعد از دو ماه جراحی دیافراگم ضروری است.
 ج) درمان خاصی برای این اختلال وجود ندارد.
 د) نوزاد باید به طرف سالم خوابانده شود.

۱۱۸ - نوزاد یک روزه، استفراغ مکرر، مداوم، غیرجهنده و حجمیم دارد. همه گزینه‌ها در مورد علت آن درست است، بجز:

- الف) انسداد روده کوچک
 ب) تحريك مخاط معده به دلیل مواد بلع شده
 ج) افزایش فشار داخل جمجمه
 د) اختلالات متابولیک

۱۱۹ - در مقایسه تعداد ضربان قلب پالس اکسی متري با نمایشگر قلبی تنفسی میزان اختلاف دو دستگاه چند ضربان در دقیقه باشد قابل قبول است؟

- د) پنج ج) پانزده ب) بیست الف) ده

۱۲۰ - کدام گزینه در مورد احیاء نوزاد دچار آپنه درست است؟

- الف) کلیه وسایل اکسیژن رسانی قادر به تامین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اکسیژن باشد.
 ب) در صورت عدم افزایش تنفس ماسک اکسیژن بر روی بینی قرار داده شود.
 ج) شاخص اولیه تهییه مناسب، بهبود تعداد تنفس است
 د) جریان سنج روى $20\text{ L}/\text{minute}$ - $15\text{ - }15$ تنظیم شود