

## وشه: مامایی (ب)

- ۱۹ - انجام ماموگرافی در کدام یک از سطوح پیشگیری مطرح می‌شود؟
- الف) بدوى      ب) اولىه      ج) ثانويه      د) ثالثيه
- ۲۰ - نياز به کدام یک از مواد غذائي زير در شيردهى نسبت به حاملگى افزایش می‌يابد؟
- الف) ويتامين A      ب) كلسيم      ج) آهن      د) پروتئين
- ۲۱ - اگر در يك دختر ۱۲ ساله تمام نسج پستان برجسته باشد، موهای ضخیم و بلند و مجعد بر روی مونس پوییس دیده شود، وی در چه مرحله‌ای از مراحل تائز است؟
- الف) I      ب) II      ج) III      د) V
- ۲۲ - در يك دختر ۱۶ ساله که صفات ثانويه جنسی وی کامل است، اما قاعده‌گی اتفاق نیفتاده است، کدام یک از اختلالات زیر محتمل است؟
- الف) هیپوگنادیسم هیپرگنادوتروپیک  
ب) آرنزی یا دیس ژنزی مولرین  
ج) سندرم ترنر  
د) سندرم کالمون
- ۲۳ - کدام یک از مطالب زیر در مورد خطر ابتلا به سرطان پستان در موارد هورمون درمانی در زنان یائسه درست است؟
- الف) هورمون درمانی کمتر از ۵ سال خطر ابتلا را افزایش می‌دهد  
ب) استفاده همزمان استروژن و پروژسترون خطر ابتلا را کاهش می‌دهد  
ج) خطر ابتلا در استفاده از پروژسترون به تنها یک کاهش می‌يابد  
د) خطر ابتلا در استفاده از استروژن به تنها یک افزایش نمی‌يابد
- ۲۴ - خانمی پس از یائسگی دچار علایم تکرار و فوریت ادراری، آتروفی واژن و گرگرفتگی شده است. کدام یک از درمان‌های زیر را برای وی پیشنهاد می‌کنید؟
- الف) گاباپنتین  
ب) کرم پره مارین  
ج) قرص واژینال Vagifem  
د) استروژن سیستمیک

**بیماری‌های داخلی و جراحی مربوط به مامائی**

- ۲۵ - کدام یک از عوامل زیر، در ایجاد بیماری ترومبوآمبولیک در دوران حاملگی نقش دارد؟
- الف) کاهش پروتئین C و افزایش پروتئین S  
ب) افزایش پروتئین S و افزایش آنتی ترومبوین  
ج) کاهش پروتئین C و کاهش پروتئین S  
د) کاهش آنتی ترومبوین و افزایش پروتئین C