

۵۲ - کدام مادر باردار را برای مشاوره، نیازمند ارجاع به متخصص نمی دانید؟

(الف) بارداری اول ۳۱ ساله

(ب) گراوید دو، دچار پیلوفریت

(ج) پست دیت (Post date) ۴۱ هفته و دو روز

(د) ۱۵ هفته بارداری، دچار خونریزی واژینال

۵۳ - در طول بارداری و لیبر باید بر کدام نوع تنفس تاکید شود؟

(الف) شکمی منظم (ب) حبس طولانی دم (ج) بازدم خیلی کوتاه (د) دم کم عمق

۵۴ - از انجام کدام یک از ورزش های زیر در طی بارداری باید اجتناب کرد؟

(الف) شنا (ب) دوچرخه سواری (ج) آئروبیک (د) بسکتبال

۵۵ - در مورد برنامه زایمان (Birth Plan) کدام گزینه درست است؟

(الف) جهت برآوردن نیازهای مادر، فقط در طی زایمان تنظیم می شود.

(ب) قراردادی است شفاهی که بین ماما و مادر تنظیم می شود.

(ج) ابزاری ارزشمند برای ماماها است.

(د) سندی است که قابل تغییر نمی باشد.

۵۶ - برای خانم گراوید یک، با حاملگی ۳۹ هفته که با شکایت اصلی شروع درد زایمان مراجعه کرده و حرکت جنین خوب بوده است، کدام اقدام را پیشنهاد می کنید؟

(الف) پیگیری انتظاری

(ب) تجویز میزوپروستول

(ج) القای زایمان با اکسی توسین

(د) تجویز سولفات منیزیم

۵۷ - در کدام مورد القای زایمان انجام نمی شود؟

(الف) پست ترم (ب) کوریوآمنیونایتیس (ج) هرپس تناسلی (د) پره اکلامپسی شدید

۵۸ - پوزیشن نیمه نشسته مادر، با ران های از هم دور شده، در هنگام زایمان، چه تاثیری بر خروجی لگن دارد؟

(الف) استخوان دنبالچه مادر به جلو رانده و باعث تنگی خروجی لگن می شود.

(ب) چون فشاری به لگن وارد نمی شود بنابراین خروجی لگن تغییر نمی کند.

(ج) فشار به لیگامان ساکرواسپاینوس موجب کاهش خروجی لگن می شود.

(د) سمفیزپوبیس جابجا می شود و موجب افزایش خروجی لگن می شود.

۵۹ - کدام عبارت در مرحله اول زایمان نادرست است؟

(الف) بیشترین سرعت نزول سر جنین، پس از دیلاتاسیون ۵ سانتی متر رخ می دهد.

(ب) وجود انقباضات رحمی همراه با پارگی پرده ها یا نمایش خونی نشانه شروع زایمان است.

(ج) وجود دیلاتاسیون ۵ - ۳ سانتی متر همراه با انقباضات، نشانه زایمان فعال است.

(د) مرحله نهفته زایمان در حد ۲۰ ساعت، مرحله نهفته طولانی تلقی می شود.