

- ۶۷ - نوشیدنی ورزشی استاندارد Standard sport drink حاوی چند میلی گرم در لیتر کلسیم است؟
- (الف) ۲۰۰ (ب) ۱۰۰ (ج) ۵۰ (د) ۰ (صفیر)
- ۶۸ - در طراحی رژیم کتوژنیک به نسبت ۴:۱ برای پسر بچه ۵ ساله با وزن ۱۸ کیلوگرم مقدار پروتئین محاسبه شده تقریباً چند گرم است؟
- (الف) ۹ (ب) ۱۵ (ج) ۱۸ (د) ۲۱
- ۶۹ - برای بیمار مرد همودیالیزی با وزن ایده آل ۶۰ کیلوگرم مقدار پروتئین توصیه شده چند گرم است؟
- (الف) ۴۸ (ب) ۶۰ (ج) ۷۲ (د) ۹۰
- ۷۰ - کدامیک حاوی اسید الازیک Ellagic acid است؟
- (الف) هندوانه (ب) گردو (ج) پیاز (د) انگور قرمز
- ۷۱ - در افراد دیابتیک نوع (II) تجویز داروهای کدام خانواده باعث افزایش وزن نمی شود؟
- (الف) Biguanides (ب) Sulfonylureas (ج) Thiazolidinediones (د) Glinides
- ۷۲ - افزایش شکننده گلبولهای قرمز همراه با کاهش هموگلوبین، آهن سرم و غلظت فربین از علایم کدامیک می باشد؟
- (الف) تالاسمی (ب) آنمی ورزشی (ج) آنمی بارداری (د) آنمی Sicke Cell
- ۷۳ - حداقل میزان مایعات مصرفی روزانه در بیماران همودیالیزی علاوه بر حجم ادرار چقدر می باشد؟
- (الف) ۵۰۰ سی سی (ب) ۱۵۰۰ سی سی (ج) ۱۰۰۰ سی سی (د) ۶۰۰ سی سی
- ۷۴ - ویتامین K جهت سنتز کدامیک از پروتئین های زیر لازم است؟
- (الف) آلبومین (ب) فاکتور انعقادی V (ج) استئوکلسین (د) گلبولین
- ۷۵ - کدامیک از آپوپروتئین های زیر سبب کاهش اشتها می شود؟
- (الف) apoA I (ب) apoA II (ج) apoA VI (د) apo(a)
- موکز تخصصی خدمات آموزشی کروه بزشکی نخبگان**
دکترای تخصصی کارشناسی ارشد کارданی به کارشناسی
مجموعه زیست شناسی
- زیر نظر دکتر دعائی**
۰۲۱-۶۶۹۰۲۰۶۱/۶۶۹۰۲۰۳۸
۰۹۳۷۲۲۲۳۷۵۶
www.nokhbeagan.com
- ۷۶ - کدامیک جزء عوارض داروهای گلوكوكورتيكويدي نمی باشد؟
- (الف) افزایش اشتها (ب) تجمع آب و سدیم (ج) افزایش غلظت گلوكز (د) کمبود آهن
- ۷۷ - در بیماران همودیالیزی کدامیک از اشکال ویتامین D تجویز می شود؟
- (الف) ارگوکسی فرول (ب) کوله کلسی فرول (ج) ۲۵-هیدروکسی کوله کلسی فرول (د) ۱ و ۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسی فرول
- ۷۸ - بیان ژنی Calbindin در روده کوچک تحت تاثیر کدام ماده مغذی صورت می گیرد؟
- (الف) ویتامین A (ب) کلیسم (ج) مس (د) ویتامین D