

سوال ۴۲ – کدامیک از دامنه‌های دفع ادراری ید نشان دهنده وضعیت متوسط کمبود ید در جامعه می‌باشد؟

- الف) کمتر از ۲۰ میکروگرم در لیتر
- ب) ۲۰-۴۹ میکروگرم در لیتر
- ج) ۵۰-۹۹ میکروگرم در لیتر
- د) ۱۰۰-۱۹۹ میکروگرم در لیتر

سوال ۴۳ – کدام یک از داروهای زیر جذب ویتامین B₁₂ را مختل می‌کند؟

- د) کولشی سین
- ج) سیپرو فلوکساسین
- ب) لازیکس
- الف) تتراسایکلین

سوال ۴۴ – کدام ماده غذایی آنتوسبیانین بیشتری دارد؟

- د) توت فرنگی
- ج) زغال اخته
- ب) لیموترش
- الف) سیب درختی

سوال ۴۵ – در کدام بیماری می‌بایست وضعیت ویتامین B₁₂ مورد ارزیابی قرار گیرد؟

- د) بیماری روده تحریک‌پذیر
- ب) گاستریت آتروفیک
- ج) بیماری کرون
- الف) زخم اثنی عشر

سوال ۴۶ – کدامیک دارای اثر ضدالتهاب (Anti Inflammatory) است؟

- الف) چربی‌های ترانس
- ب) اسیدهای چرب تک غیراشباع
- ج) اسیدهای چرب اشباع
- د) روغن‌های گیاهی امگام

سوال ۴۷ – کدامیک از جملات زیر در کودکان دچار کواشیور کور صحیح است؟

- الف) همزمان با شروع درمان، افزایش وزن آغاز می‌گردد
- ب) مقدار پتاسیم تمام بدن کاهش قابل ملاحظه‌تری در مقایسه با پروتئین تام بدن دارد
- ج) نمایه کراتینین به قد (CHI) در حد ثابت باقی می‌ماند
- د) تأثیری در رشد قدی ندارد

سوال ۴۸ – کدام جمله در مورد Mg صحیح است؟

- الف) کمبود آن باعث کمبود K سلولی می‌گردد
- ب) کمبود آن باعث کمبود Ca سلولی می‌گردد
- ج) افزایش دریافت آن باعث بهبود جذب P می‌گردد
- د) افزایش دریافت آن باعث بهبود جذب Zn می‌گردد

سوال ۴۹ – مقدار توصیه شده ویتامین‌ها در تغذیه فرآورده‌ای (Parenteral) در مقایسه با تغذیه روده‌ای چه تفاوتی دارد؟

- د) به نوع ویتامین بستگی دارد.
- ج) کمتر است.
- ب) برابر است.
- الف) بیشتر است.